



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE – AMBIENTE

Servizio Tutela Aria e Acqua – Ufficio Catasto Scarichi e Tutela Corpi Idrici Superficiali

Via S. Paolo, is. 361, ex I.A.I. - 98122 Messina - Tel. 0907761657 - E-mail: tutelacque@cittametropolitana.me.it – protocollo@pec.prov.me.it

MONITORAGGIO ACQUE R.N.O. CAPO PELORO

Gennaio – Dicembre 2025

Rilievi in campo, analisi e stesura del documento a cura del sottoelencato Personale della VI Direzione - Servizio Tutela Aria e Acque - Ufficio Catasto Scarichi e Tutela Corpi Idrici Superficiali:

Dott. C. CAMMAROTO

Dott. A. LO PRESTI

Dott. A. CELONA

Tutte le misurazioni in campo, effettuate dalle rive lacustri, sono state eseguite mensilmente a partire da gennaio e sono proseguite, senza eccezioni, sino alla fine dell’anno.

I punti di misurazione da riva, integralmente mantenuti rispetto alle precedenti annualità, sono quelli indicati in giallo sulla seguente mappa e sotto rassegnati.



Figura A - Localizzazione dei punti di misura e campionamento

Pantano Ganzirri	Canale interlacustre Margi	Pantano Faro
1 - Estremità SO	6 - Via Scilla	7 - Istituto Marino
2 - Via Lago Grande, 61		8 - Via Pantanello
3 - Pinetina		
4 - Estremità NE (Imbocco Canale Margi)		
5 - Via Consolare Pompea, 1931		

Le misurazioni hanno riguardato, esclusivamente, le grandezze chimico-fisiche, ovvero pH, Temperatura, Conducibilità, Ossigeno disciolto (concentrazione e percentuale di saturazione) e Potenziale redox.

Tab. 1 - Lago Grande (o di Ganzirri), Lago Piccolo (o Faro) e Canale interlacuale Margi – Misure da sponda

R.N.O. Capo Peloro		Lago Grande						C. Margi	Lago Piccolo		
		1	2	3	4	5	Media	6	7	8	Media
20.01.25	pH	8,20	8,50	8,40	8,50	8,50	8,4	8,10	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	13,80	13,50	13,60	13,70	13,80	13,7	15,10	13,90	13,90	13,9
	Conducibilità (mS/cm)	50,11	53,43	49,94	54,34	53,18	52,2	49,18	53,54	54,90	54,2
	O ₂ (mg/l)	8,50	8,20	6,90	7,80	8,00	7,9	4,20	7,70	8,20	8,0
	O ₂ (% sat.)	98,70	96,30	80,20	93,10	94,70	80,7	49,00	91,70	97,50	94,6
	ORP (mV)	-18,50	3,20	21,30	23,90	35,40	13,1	35,50	45,60	2,80	24,2
11.02.25	pH	8,40	8,50	8,30	8,50	8,40	8,4	8,20	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	14,20	13,70	13,30	13,90	14,70	14	14,90	15,70	14,70	15,2
	Conducibilità (mS/cm)	50,00	50,74	48,01	51,29	49,51	49,9	41,19	52,68	53,74	53,2
	O ₂ (mg/l)	7,12	7,27	5,74	7,35	7,14	6,9	6,34	7,35	7,22	7,3
	O ₂ (% sat.)	82,30	83,60	64,50	85,30	83,30	79,8	62,00	89,10	85,90	87,5
	ORP (mV)	-20,60	7,20	11,00	6,10	54,20	11,6	10,60	17,70	33,90	25,8
17.03.25	pH	8,10	8,30	8,20	8,30	8,30	8,2	8,20	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	18,00	17,50	16,30	16,80	17,70	17,3	18,80	17,40	17,20	17,3
	Conducibilità (mS/cm)	50,54	51,60	51,16	53,10	51,67	51,6	49,70	57,52	56,66	57,1
	O ₂ (mg/l)	6,60	7,20	6,40	8,00	6,90	7,0	6,71	6,70	6,60	6,7
	O ₂ (% sat.)	83,60	91,10	78,40	100,0	87,10	88,0	84,90	86,70	84,30	85,5
	ORP (mV)	6,20	23,10	32,60	15,60	34,50	22,4	13,00	31,40	39,40	35,4
07.04.25	pH	8,20	8,30	8,50	8,30	8,50	8,4	8,20	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	20,60	20,00	18,70	20,10	19,70	19,8	20,60	19,50	19,20	19,4
	Conducibilità (mS/cm)	47,10	47,41	46,84	48,76	47,03	47,4	51,24	51,96	55,27	53,6
	O ₂ (mg/l)	6,00	5,50	6,90	4,64	6,45	5,9	6,50	6,90	6,80	6,9
	O ₂ (% sat.)	78,80	72,50	87,60	61,10	83,60	76,7	86,90	91,50	91,20	91,4
	ORP (mV)	-8,90	33,10	35,20	-107,0	48,50	0,2	47,20	49,00	21,70	35,4
08.05.25	pH	8,10	8,20	8,10	7,90	8,10	8,1	7,90	8,00	8,10	8,1
	Temp. (°C)	24,20	24,10	23,60	23,10	23,90	23,8	24,40	23,40	23,50	23,5
	Conducibilità (mS/cm)	50,72	50,98	47,28	53,25	50,55	50,6	52,96	52,82	57,00	54,9
	O ₂ (mg/l)	4,15	5,46	5,55	3,10	3,80	4,4	3,20	5,90	5,70	5,8
	O ₂ (% sat.)	58,80	78,00	77,30	44,00	53,30	62,3	47,00	84,20	82,70	83,5
	ORP (mV)	30,00	25,70	30,80	34,90	5,20	25,3	9,30	29,10	32,70	30,9
09.06.25	pH	8,10	8,30	8,20	8,10	8,20	8,18	7,80	8,20	8,20	8,2
	Temp. (°C)	28,50	27,60	26,90	25,70	28,40	27,42	27,70	26,80	27,20	27,0
	Conducibilità (mS/cm)	50,52	51,00	46,54	53,70	52,26	50,80	52,63	57,14	57,35	57,2
	O ₂ (mg/l)	4,90	5,60	4,70	2,50	3,20	4,18	2,50	6,60	6,10	6,4
	O ₂ (% sat.)	74,00	83,60	68,20	33,40	48,50	61,54	38,20	99,40	92,70	96,1
	ORP (mV)	-41,50	-2,10	-4,20	-53,8	-31,80	-26,68	-167,0	-31,70	-6,30	-19,0

R.N.O. Capo Peloro		Lago Grande						C. Margi	Lago Piccolo		
		1	2	3	4	5	Media	6	7	8	Media
15.07.25	pH	8,40	8,50	8,20	8,20	8,40	8,3	7,90	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	29,90	30,10	28,30	27,80	30,00	29,2	29,10	28,60	28,70	28,7
	Conducibilità (mS/cm)	52,31	54,26	52,48	55,33	53,92	53,7	57,25	57,12	58,78	58,0
	O ₂ (mg/l)	6,10	7,70	2,60	4,00	5,20	5,1	1,70	5,50	5,20	5,4
	O ₂ (% sat.)	95,80	123,4	40,00	61,20	82,20	80,5	26,80	86,60	81,10	83,9
	ORP (mV)	7,20	13,00	-9,40	-39,70	-26,50	-11,1	12,80	-48,80	-10,10	-29,5
07.08.25	pH	8,40	8,40	8,00	8,00	8,40	8,2	8,20	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	28,60	27,90	26,60	28,40	29,00	28,1	27,40	27,60	27,70	27,7
	Conducibilità (mS/cm)	53,37	54,04	50,08	55,70	53,93	53,4	58,41	58,38	57,61	58,0
	O ₂ (mg/l)	5,30	4,00	2,10	1,10	5,10	3,5	3,50	5,60	5,50	5,6
	O ₂ (% sat.)	82,10	61,00	30,50	17,00	78,90	53,9	54,00	86,40	84,90	85,7
	ORP (mV)	-11,50	5,20	-22,40	-84,4	-11,40	-24,9	-15,30	-3,40	-21,20	-12,3
15.09.25	pH	8,10	8,30	8,00	7,90	8,20	8,1	7,80	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	28,40	28,00	26,00	26,60	27,70	27,3	26,40	27,20	27,10	27,2
	Conducibilità (mS/cm)	56,73	57,15	52,92	55,22	56,70	55,7	47,18	59,43	59,55	59,5
	O ₂ (mg/l)	3,70	4,50	2,70	2,30	4,30	3,5	2,70	5,20	5,20	5,2
	O ₂ (% sat.)	57,00	69,40	39,10	34,70	64,50	52,9	38,80	80,30	78,80	79,6
	ORP (mV)	10,10	18,70	-10,90	-37,1	-32,30	-10,3	-38,30	-32,70	-22,40	-27,6
08.10.25	pH	7,90	8,00	7,90	8,20	8,00	8,0	7,90	8,20	8,20	8,2
	Temp. (°C)	20,80	21,10	17,70	18,40	21,00	19,8	19,10	20,70	20,50	20,6
	Conducibilità (mS/cm)	55,32	56,55	56,36	57,54	55,63	56,28	45,86	59,14	59,04	59,09
	O ₂ (mg/l)	5,40	5,10	4,50	4,50	4,80	4,86	2,90	5,10	4,90	5,0
	O ₂ (% sat.)	72,50	70,20	57,60	58,60	65,70	64,92	36,50	70,40	66,50	68,45
	ORP (mV)	6,80	12,60	12,80	17,30	18,20	13,54	16,30	22,00	24,30	23,15
24.11.25	pH	7,90	8,10	8,30	8,20	8,30	8,16	8,20	8,30	8,30	8,3
	Temp. (°C)	18,70	17,50	16,10	16,20	16,40	16,98	15,70	17,40	17,30	17,35
	Conducibilità (mS/cm)	53,97	54,02	47,60	53,40	52,63	52,32	46,44	51,16	53,73	52,45
	O ₂ (mg/l)	4,50	6,30	7,00	6,50	6,70	6,2	7,10	6,70	6,40	6,55
	O ₂ (% sat.)	57,50	79,80	85,50	80,70	82,80	77,26	85,80	83,30	80,50	81,9
	ORP (mV)	42,80	44,40	45,80	48,10	56,50	47,52	43,50	47,70	49,80	48,8
10.12.25	pH	8,00	8,30	8,30	8,10	8,30	8,2	8,00	8,20	8,20	8,2
	Temp. (°C)	16,10	15,70	15,40	17,60	16,60	16,28	16,90	16,90	16,80	16,85
	Conducibilità (mS/cm)	49,44	53,38	52,31	56,62	53,47	53,04	50,70	56,96	57,62	57,29
	O ₂ (mg/l)	7,90	7,90	7,20	4,50	7,80	7,06	5,10	6,20	5,70	5,95
	O ₂ (% sat.)	94,30	96,20	86,70	57,30	96,80	86,26	62,70	78,40	71,50	74,95
	ORP (mV)	-31,00	7,50	12,20	-82,4	15,10	-15,72	-11,90	-0,60	5,10	2,25

Commenti

1. Lago Grande o Ganzirri

1.1. Rilevamenti da sponda – valori mediati tra le 5 stazioni

pH - il pH, mediato tra le 5 stazioni di misura, si è mantenuto sostanzialmente costante nell'arco dell'intera campagna annuale, con valori di modesta alcalinità contenuti tra gli estremi 7,9 e 8,5.

Temperatura (°C) - come atteso, stante il volume relativamente esiguo contenuto nello specchio lacustre, rispetto alla superficie esposta, l'andamento parametrico ha seguito molto da vicino le oscillazioni della temperatura esterna e si è collocato tra 13,3 (febbraio) e 30,1 (luglio). Appare opportuno sottolineare che detti numeri, con ogni probabilità, non corrispondono ai massimi od ai minimi giornalieri assoluti, puntuali o mediati che siano, considerato che i rilievi operati sono sempre occorsi nelle ore antimeridiane.

Conducibilità (mS/cm) - il parametro tende per sua natura ad oscillare in ragione degli eventi precipitativi che molto lo influenzano. Gli estremi registrati sono stati 46,5 (giugno) e 57,5 (ottobre).

Ossigeno disciolto (mg/l) - il parametro notoriamente risente di due circostanze concomitanti (irraggiamento e ventilazione) e, come molte volte osservato, si muove su un ampio range di variabilità, anche nel corso della stessa giornata. I minimi e massimi intercettati sono stati 1,1 (agosto) e 8,5 (gennaio). Non sono state, comunque, registrate mortificazioni dell'ittiofauna legate ad eventuali fenomeni di anossia.

Potenziale ossidoriduttivo (mV) - il valore medio si è mantenuto su posizioni comprese tra -107,0 (aprile) e 54,2 (febbraio), con una più elevata frequenza di valori negativi nel periodo estivo a testimonianza di una lieve sofferenza dovuta alle temperature ovviamente più elevate.

Particolari eventi critici osservati:

Immissione di acque di natura non determinata in corrispondenza della Via Petrarco (02 agosto e 10 dicembre). Gli episodi sono stati segnalati tempestivamente ai soggetti Gestori delle reti di scarico.

2. Lago Piccolo o Faro

2.1. Rilevamenti da terra – valori mediati tra le 2 stazioni

pH - il pH, mediato tra le 2 stazioni di misura, si è mantenuto sostanzialmente costante nell'arco dell'intera campagna annuale, con valori di modesta alcalinità contenuti tra gli estremi 8,0 e 8,3.

Temperatura (°C) - si è collocata tra 13,9 (gennaio) e 28,7 (luglio) seguendo la stagionalità.

Conducibilità (mScm⁻¹) - i valori misurati risultano costantemente più elevati, se raffrontati a quelli rilevati nel Lago Grande. Questo si spiega con la contemporanea azione di due fattori. Innanzitutto, vista la conformazione del territorio circostante, sul Lago Faro incidono meno gli apporti di acque dolci meteoriche che dilavano le aree di terraferma e che hanno recapito terminale nel corpo idrico in questione. Secondariamente, rispetto al Lago Grande, il Piccolo ha un maggiore volume di acque proprie. Ne consegue che gli impatti sulla salinità originale sono più attenuati. Non sorprende, quindi, che detto parametro mantenga valori più prossimi a quelli squisitamente marini. I minimi e massimi: 51,16 (novembre) e 59,5 (settembre).

Ossigeno disciolto (mg/l) - anche per questo parametro chimico-fisico il Lago Piccolo offre a considerare una minore variabilità, specie verso il basso, se paragonata al Lago di Ganzirri. Il suo tenore è stato compreso tra e 4,9 (ottobre) e 8,2 (gennaio).

Potenziale ossidoriduttivo (mV) - il valore si è attestato tra il minimo di – 48,80 (luglio) e il massimo di 49,80 (novembre). Valgono anche per il Lago Piccolo le osservazioni in merito al ripetersi di valori negativi nella stagione estiva.

Particolari eventi critici rilevati: immissione di acque, di natura non determinata, da Via Pantanello nel Canalone Faro, ossia sul condotto di collegamento alle acque marine dello Stretto (07 agosto). Il rilascio anomalo è stato segnalato, come consuetudine, al Gestore idrico.

3. Canale Margi






3.1. Rilevamenti da sponda – Punto di misura in Via Scilla

Già in precedenza è stata evidenziata la particolare suscettibilità di questo tratto interlacustre agli insulti ambientali ed alle alterazioni endogene. Il breve battente idraulico, ad esempio, o la notevole tendenza allo sviluppo di macroalghe e la presenza di insediamenti a ridosso delle sponde ne riducono la possibilità di scambio idrico e lo rendono, pertanto, più vulnerabile.






Fortunatamente, come le tabelle analitiche confermano, il chimismo complessivo è stato buono. Il tenore di Ossigeno disciolto si è collocato su valori medio-bassi nei mesi più caldi, ma non si sono registrate situazioni ipossiche. Si annota come dato anomalo, rispetto alla media, il valore di potenziale redox pari a - 167 mV nel mese di giugno.

Grafici

Lago Grande o di Ganzirri – Misurazioni da riva



Lago Piccolo o Faro – Misurazioni da riva



Canale Margi – Misurazioni da riva

